



**camfic**

societat catalana de  
medicina familiar i  
comunitària

## 20 d'octubre, Dia de la Prova de detecció del VIH

Durant el 2009, es van realitzar més de 300.000 proves del VIH

S'han practicat 2.649 tests ràpids en 36 oficines de farmàcia de 21 poblacions en els darrers catorze mesos

S'han format 1.361 professionals sanitaris d'atenció primària sobre habilitats en l'oferta del test arreu de Catalunya

S'ha realitzat una campanya adreçada al col·lectiu gai per oferir el cribatge de les infeccions de transmissió sexual com a facilitadores de la infecció pel VIH i conèixer-ne el grau d'incidència

Des de l'inici de l'epidèmia, l'octubre de 1981, fins al 30 de juny de 2010 s'han diagnosticat a Catalunya un total de **16.430 casos de sida** a Catalunya, dels quals 174 han estat diagnosticats durant l'any 2009. Pel que fa al sistema voluntari de declaració de nous diagnòstics d'infecció pel VIH, des de la posada en marxa l'any 2001 fins al 30 de juny de 2010, s'han notificat **6.134 nous diagnòstics d'infecció pel VIH**, dels quals 560 han estat diagnosticats durant l'any 2009. El 77,9% són homes i el 22,1% dones, i la població d'edat més afectada és la compresa entre els 25 i 39 anys. La principal via de transmissió del VIH entre els nous diagnòstics d'infecció pel VIH és la **via sexual amb un 78,7%** (42,2% en relacions heterosexuales i 36,5% homosexuals). És important destacar que el 37,0% dels nous diagnòstics d'infecció s'han diagnosticat tardanament. La proporció de casos amb retard en el diagnòstic entre les infeccions pel VIH és major entre els homes, entre el grup de transmissió heterosexual i entre els majors de 44 anys.

El 20 d'octubre se celebra el Dia de la Prova de Detecció del VIH. L'objectiu d'aquesta celebració és incentivar la pràctica del test diagnòstic del VIH en les persones que ja han estat exposades a situacions de risc d'infecció pel virus. Enguany, algunes de les iniciatives que es duran a terme són les següents:

### 1. Test ràpid del VIH a les oficines de farmàcia

El Departament de Salut i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona van iniciar el mes d'abril de 2009 una prova pilot que permet actuar conjuntament en la prevenció i el control de la infecció pel VIH, amb l'objectiu de facilitar l'accés de la prova a les poblacions més vulnerables, que no acostumen a adreçar-se a la xarxa sanitària, i evitar el retard en el diagnòstic. En aquests darrers catorze mesos, s'han realitzat 2.649 tests de cribatge, el 71% dels quals han estat homes i un 9% persones novingudes. La mitjana d'edat ha estat de 33,7 anys. El motiu principal de la demanda han estat les relacions sexuals de risc en un 87% de les peticions. S'han obtingut 24 resultats positius, 14 dels quals han pogut ser confirmats pels laboratoris de referència.

En aquest període de temps, la demanda ha estat constant i la seva pràctica s'ha integrat en els serveis que s'ofereixen des de les oficines de farmàcia, que la duen a terme

## **2. Formació en l'atenció primària**

La **Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC)**, per mitjà d'un conveni signat amb el Departament de Salut, aquest any ha estès l'àmbit d'actuació a les comarques de Girona, i ha format 172 professionals, que han impartit 68 cursos sobre habilitats en l'oferta del test des de la consulta per **promoure el diagnòstic precoç de la infecció pel VIH en l'atenció primària**. S'ha arribat a formar 1.361 professionals dels equips d'atenció primària.

Continuaran formant-se professionals sanitaris a partir dels formadors de formadors fins que es completin tots els centres d'atenció primària a Catalunya.

## **3. Actes de sensibilització i intervencions de les ONG**

L'ONG Associació Ciutadana Antisida de Catalunya organitza l'activitat central a Barcelona ciutat, i ha instal·lat un envelat a la plaça de Catalunya. D'altra banda, l'entitat Projecte dels Noms-Hispanosida, amb l'inici de l'estudi Check-ear, en la seva seu BCN Checkpoint, facilitarà la detecció de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i el seu diagnòstic precoç, que permetrà conèixer-ne la incidència i la prevalença en homes que tenen relacions sexuals amb homes, perquè no hem d'oblidar que les ITS, que són la causa de les hepatitis, la sífilis, la gonocòccia, la clamídia i el papil·lomavirus humà, afavoreixen la infecció pel VIH. L'entitat presentarà l'estudi properament.